



Rápida ação
Efeito residual

Código Comercial

500 g

101.094

Composição

Temefós 1% (p/p)

Formulação

Sólido/granulado

Indicações de uso

Larvicida em grânulos, para uso profissional e em campanhas de saúde pública, indicado para o controle de larvas de mosquitos. Pode ser aplicado sobre coleções de água que sirvam como criadouros para mosquitos.

Mecanismo de ação

Larvicida do grupo organofosforado, inibidor da enzima acetilcolinesterase, que atua na quebra da acetilcolina, um neurotransmissor responsável pelos impulsos nervosos. A inibição da enzima mantém a acetilcolina ligada aos receptores sinápticos dos neurônios, ocasionando constante transmissão nervosa, gerando excitação, paralisia e morte do inseto.

Apresentação

Caixa com 40 embalagens de 500 g.



LARVEK® 1G

Controle de larvas de mosquitos com rápidos resultados

Modo de usar

Aplicar através de polvilhamento (aplicador de grânulos) sobre qualquer coleção de água (lagos, lagoas, represas, córregos, poças, águas cobertas por vegetação e outros) que sirvam como criadouro para mosquitos, de acordo com a dosagem especificada na tabela abaixo.


Pragas alvo	Dosagem
Mosquitos	1 g /10 L de água

Precauções

CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS. CUIDADO! PERIGOSA SUA INGESTÃO, INALAÇÃO OU ABSORÇÃO PELA PELE. Não aplicar sobre alimentos, utensílios de cozinha, plantas e aquários. Não comer, fumar e nem beber durante a aplicação. Manter o produto na embalagem original. Não reutilizar as embalagens vazias. Durante a aplicação não devem permanecer no local pessoas ou animais domésticos. Evitar contato com a pele e os olhos. Advertir aos usuários sobre as medidas de segurança e precauções a tomar para evitar acidentes. Usar roupas protetoras adequadas, luvas, proteção ocular e/ou respiratória.



Fórmula molecular



Toxicologia

DL50 oral aguda para ratos..... > 2.000 mg/Kg

DL50 dermal aguda para ratos..... > 2.000 mg/Kg

Classificação toxicológica

Temefós - Classe III

Período de reentrada

Não é necessário desocupar a área para realizar a aplicação.

Sinais e sintomas de intoxicação

Reações de salivação, irritabilidade, tremores e ataxia, distúrbios respiratórios e cardiovasculares.

Armazenagem

Armazenar o produto em local adequado e longe de fontes de calor.

Vazamento acidental

Absorver o produto com material inerte tal como: papel toalha, terra, areia, caulim e pano. Isolar e sinalizar a área. Utilizar EPI's.

Eliminação e descarte

Não reutilize as embalagens vazias. As sobras e resíduos dos produtos devem ser descartadas conforme a legislação municipal e/ou estadual vigente. As embalagens vazias devem devolvidas em um posto credenciado pelo fabricante.

Primeiros socorros

Em caso de intoxicação, procurar o Centro de Intoxicações ou o Serviço de Saúde, levando a embalagem ou o rótulo do produto. Em caso de contato direto com o produto, lavar a parte atingida com água em abundância e sabão. Em caso de contato com os olhos, lavar imediatamente com água corrente em abundância. Se inalado em excesso, remover a pessoa para local ventilado. Em caso de ingestão acidental, não provoque o vômito.

FABRICADO POR: NEOGEN

Av. Alexandrina das Chagas Moreira, 964

CEP: 12412-800

Distrito Industrial, Pindamonhangaba/SP

CNPJ: 90.821.554/0001-42

Aut. Func. no MS nº: 3.00425-4

Indústria Brasileira - Site: www.rogama.com.br

E-mail: sac@neogen.com - SAC: (12) 3644.3030

INDICAÇÕES PARA USO MÉDICO

Princípio ativo: Temefós

Grupo químico: Organofosforado

Antídoto/Tratamento: Anti-histamínico / Tratamento sintomático

TELEFONE DE EMERGÊNCIA - 24 h:

0800 014 11 49

Nº de Registro no MS: 3.0425.0142.001-2

Nº do CAS: Temefós: 3383-96-8

